

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريش
Université Mohammed El Bachir El Ibrahimi B.B.A
كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l'Univers
قسم العلوم الفلاحية
Département des Sciences Agronomiques

Mémoire

En vue de l'obtention du diplôme de Master

Domaine des Sciences de la Nature et de la Vie

Filière : Sciences Agronomiques

Spécialité : Aménagement hydro-agricole

Intitulé :

Impact des conditions agro climatiques sur la production de colza
(*Brassica napus* L.) en Algérie

Présenté par : Benzadi Rayane

Soutenu le 11 / 06 / 2025, Devant le Jury :

	Nom & Prénom	Grade	Affiliation / institution
Président :	M. BOUZID C.	MAA	Faculté SNV-STU, Univ. de B.B.A.
Encadrant :	Mme. BOURAHLA A.	MCA	Faculté SNV-STU, Univ. de B.B.A.
Examineur :	M. DEFFAF A.	MCB	Faculté SNV-STU, Univ. de B.B.A.

Année Universitaire 2024/2025

Dédicace

Je dédie ce travail à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce parcours.

À mes chers parents,

Pour votre amour inconditionnel, votre patience et vos sacrifices silencieux. Votre foi en moi a été mon pilier, même dans les moments de doute. Ce mémoire est avant tout le fruit de votre soutien indéfectible.

À Madame **Bourahla A.**

Pour votre accompagnement bienveillant, votre écoute attentive et vos conseils précieux. Merci d'avoir cru en moi et de m'avoir guidé(e) avec autant de générosité.

À ma famille et à mes proches,

Pour vos mots rassurants, votre présence réconfortante et votre soutien constant. Vous avez su alléger le poids des défis.

À tous ceux qui ont croisé mon chemin durant cette aventure,

Merci pour vos encouragements, vos gestes simples mais essentiels, et votre inspiration.
Ce mémoire vous est dédié. Merci, du fond du cœur.

Benzadi Rayane

Remerciement

Je remercie avant tout DIEU, le Tout-Puissant, pour la volonté, la santé, la patience qu'Il m'a données, ainsi que le courage de terminer ce travail."

J'adresse mes plus vifs remerciements à ma promotrice, Mme Bourahla Amel, pour avoir bien voulu m'encadrer, pour sa patience, son aide, ses conseils et ses encouragements, ainsi que pour le temps qu'elle m'a consacré pour réaliser ce travail

J'exprime mes sincères remerciements aux honorables membres du jury :

À Mr. BOUZID Chaouki pour l'honneur qu'il m'a fait en acceptant de présider le jury de ce travail, ainsi que pour le temps et la patience qu'il a consacrés à l'évaluation de mon mémoire.

Je tiens également à adresser mes vifs remerciements à Mr. DEFFAF Ammat pour l'honneur qu'il m'a fait en acceptant d'examiner ce mémoire.

Résumé

Le colza (*Brassica napus* L.) représente une culture oléagineuse d'importance croissante à l'échelle mondiale et constitue une piste prometteuse pour la diversification agricole et la production d'huile végétale en Algérie. Ce document vise à fournir une analyse approfondie de l'impact des conditions agro climatiques algériennes sur la production de cette culture. Il explore les aspects essentiels tels que les caractéristiques pédoclimatiques des zones de culture potentielles, les itinéraires techniques adaptés, les défis agronomiques spécifiques incluant la gestion de l'eau, la pression des ravageurs et des maladies, ainsi que l'identification des variétés performantes comme la variété 'Zitna'.

L'étude s'appuie sur une revue scientifique récente et des données techniques pour évaluer les potentialités et les contraintes de la culture du colza en Algérie. Une attention particulière est portée à la valorisation des produits et coproduits du colza, notamment les tourteaux riches en protéines et minéraux, et leurs propriétés antioxydantes. Les résultats de recherches récentes sur la composition nutritionnelle et les composés bioactifs de variétés algériennes sont intégrés pour souligner la qualité et les usages potentiels.

Enfin, le document formulera des recommandations stratégiques pour optimiser la productivité, la durabilité et la rentabilité de la filière colza en Algérie, en tenant compte des spécificités locales et des innovations agronomiques. L'objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux et des opportunités liés à cette culture pour la sécurité alimentaire et le développement agricole du pays.

Mots clés : Le colza, conditions agroclimatiques, variété 'Zitna', Algérie.

Abstract

Rapeseed (*Brassica napus* L.) is an oilseed crop of increasing global importance and represents a promising avenue for agricultural diversification and vegetable oil production in Algeria. This document aims to provide an in-depth analysis of the impact of Algerian agroclimatic conditions on the production of this crop. It explores crucial aspects such as the pedoclimatic characteristics of potential cultivation areas, adapted technical itineraries, specific agronomic challenges including water management, pest and disease pressure, as well as the identification of high-performing varieties like 'Zitna'.

The study is based on a review of recent scientific literature and technical data to assess the potential and constraints of rapeseed cultivation in Algeria. Particular attention is paid to the valorization of rapeseed products and by-products, notably cakes rich in proteins and minerals, and their antioxidant properties. Findings from recent research on the nutritional composition and bioactive compounds of Algerian varieties are integrated to highlight their quality and potential uses.

Finally, the document will formulate strategic recommendations to optimize the productivity, sustainability, and profitability of the rapeseed sector in Algeria, considering local specificities and agronomic innovations. The objective is to contribute to a better understanding of the challenges and opportunities associated with this crop for the country's food security and agricultural development.

Key words : Rapeseed, agroclimatic conditions, Zitna, Algeria.

ملخص

السلجم الزيتي يُعدّ من المحاصيل الزيتية التي تكتسب أهمية متزايدة على المستوى العالمي، ويمثل خيارًا واعدًا لتنويع الأنشطة الزراعية وإنتاج الزيوت النباتية في الجزائر. وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لتأثير الظروف الزراعية والمناخية في الجزائر على إنتاج هذه المحصول. كما يستعرض الجوانب الأساسية مثل الخصائص البيئية والمناخية للمناطق المحتملة زراعتها، والممارسات الفنية الملائمة، والتحديات الزراعية الخاصة، بما في ذلك إدارة المياه، والضغط الناتج عن "الآفات والأمراض، بالإضافة إلى تحديد الأصناف ذات الأداء العالي مثل الصنف "زيتنة".

تعتمد الدراسة على المراجعة العلمية الحديثة للمعطيات التقنية لتقييم الإمكانيات والمعوقات المتعلقة بزراعة السلجم الزيتي في الجزائر. كما تم دمج نتائج الدراسات الحديثة حول التركيب الغذائي والمكونات الفعالة بيولوجيًا لأنواع السلجم بهدف تسليط الضوء على جودته واستخداماته المحتملة.

وفي الأخير توصيات استراتيجية تهدف إلى تحسين الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية لسلسلة إنتاج السلجم الزيتي في الجزائر، مع أخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية والابتكارات الزراعية. ويتمثل الهدف العام في المساهمة في فهم أفضل للتحديات والفرص المرتبطة بهذه الزراعة، وذلك في سياق تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالتنمية الزراعية في البلاد.

الكلمات المفتاحية: السلجم الزيتي، الظروف الزراعية والمناخية، الصنف "زيتنة"، الجزائر

Table des Matières

Liste des tableaux

Listes des figures

Introduction	10
Chapitre 1 : Le Colza (<i>Brassica napus</i> L.) : Présentation et Importance	12
1.1. Origine, Botanique et Cycle de Développement du Colza.....	12
1.2. Importance Économique Mondiale et Utilisations du Colza.....	14
1.3. Le Colza en Algérie : État des Lieux et Perspectives.....	16
1.3.1. Historique de la culture	16
Chapitre 2 : Exigences Agroclimatiques du Colza et Potentiel des Régions Algériennes...	19
2.1. Besoins Climatiques du Colza.....	19
2.1.1. Température et photopériode.....	19
2.1.2. Besoins en eau et sensibilité au stress hydrique	20
2.2. Exigences Pédologiques du Colza	22
2.2.1. Types de sols favorables	22
2.2.2. pH et tolérance à la salinité	22
2.3. Analyse du Potentiel Agroclimatique des Régions Algériennes pour le Colza	23
2.3.1. Zones semi-arides et subhumides.....	23
2.3.2. Cartographie des zones potentiellement favorables (Ministère de l’Agriculture Algérien., 2022)	24
Chapitre 3 : Itinéraire Technique de la Culture du Colza en Algérie.....	26
3.1. Choix Variétal : Adaptation et Performance	26
3.1.1. Variétés disponibles et homologuées en Algérie (Ex: Zitna).....	26
3.1.2. Critères de choix : rendement, précocité, résistance aux stress.....	27
3.2. Préparation du Sol et Semis	28
3.2.1. Travail du sol et faux-semis	28
3.2.2. Date, densité et profondeur de semis	29
3.3. Fertilisation Raisonnée du Colza.....	31
3.3.1. Besoins en éléments majeurs (N, P, K) et secondaires (S, Mg, B, et Mo).....	31
3.3.2. Recommandations de fumure et fractionnement des apports.....	32

Chapitre 4 : Défis Agronomiques et Stratégies d'Adaptation pour la Culture du Colza en Algérie	33
4.1. Gestion du Stress Hydrique et de la Sécheresse.....	33
4.1.1. Impact du déficit hydrique sur le rendement et la qualité	33
4.1.2. Stratégies d'adaptation : choix variétal, techniques culturales, irrigation.....	34
4.2. Intégration du Colza dans les Systèmes de Culture Algériens	35
4.2.1. Rotation des cultures et effets sur la fertilité du sol	35
4.2.2. Associations culturales possibles	35
5 Recommandations Stratégiques pour le Développement de la Filière Colza en Algérie	36
5.1. Renforcement de la Recherche et Développement.....	36
5.1.1. Sélection variétale adaptée aux conditions algériennes.....	36
5.1.2. Optimisation des itinéraires techniques.....	36
5.2. Développement de la Filière de Transformation et de Commercialisation	37
5.3. Stratégie nationale pour les oléagineux.....	37
Conclusion Générale	38
Références Bibliographiques	40

Liste des Tableaux

Tableau 1: Composition physico-chimique des graines et des tourteaux de colza (variété Zitna) – Source : Rebbah et al., 2025.....	18
Tableau 2: Composition minérale des graines et des tourteaux de colza algérien (variété Zitna) – Source : Bourahla A. et al., 2025	27
Tableau 3: Besoins nutritifs du colza	31
Tableau 4: Recommandations d'apport	32

Liste des Figures

Figure 1.1: Cycle végétatif du Colza.....	13
Figure 1.2: Huile du Colza	15
Figure 1.3: Tourteau de colza.....	16
Figure 2.1: Un champ de Colza en fleur en Algérie.....	Error! Bookmark not defined.
Figure 2.2: plantule de colza	Error! Bookmark not defined.
Figure 2.3: Siliques de Colza	Error! Bookmark not defined.
Figure 2.4: Graines de Colza.....	Error! Bookmark not defined.
Figure 2.5: semoir de précision pour colza	30

Introduction

L'Algérie, à l'instar de nombreux pays, fait face à des défis croissants en matière de sécurité alimentaire et de diversification de sa production agricole. Dans ce contexte, la promotion de cultures à haute valeur ajoutée et adaptées aux conditions agroclimatiques locales revêt une importance stratégique. Parmi celles-ci, le colza (*Brassica napus* L.), une plante oléagineuse majeure à l'échelle mondiale, présente un potentiel considérable pour l'Algérie, tant pour la production d'huile végétale destinée à la consommation humaine et à l'industrie, que pour la fourniture de tourteaux riches en protéines pour l'alimentation animale. L'introduction et le développement de la culture du colza pourraient ainsi contribuer à réduire la dépendance du pays aux importations d'huiles végétales et de matières premières pour l'alimentation du bétail, tout en offrant aux agriculteurs une alternative de culture potentiellement rentable et bénéfique pour la structure des sols dans les assolements (**Achacha m. et al., 2023**).

Cependant, le succès de l'implantation et de l'expansion de la culture du colza en Algérie est intrinsèquement lié à une compréhension approfondie de l'interaction complexe entre la plante et son environnement. Les conditions agroclimatiques, incluant les régimes pluviométriques et thermiques, la nature des sols, ainsi que les stress abiotiques tels que la sécheresse et la salinité, jouent un rôle déterminant dans la croissance, le développement et le rendement du colza. De plus, la gestion des aspects agronomiques, tels que le choix variétal, les techniques culturales (préparation du sol, semis, fertilisation, irrigation d'appoint), la maîtrise des bioagresseurs (ravageurs et maladies) et des adventices, est cruciale pour optimiser la production (**Bourahla A., 2024a**).

Des recherches récentes menées en Algérie, notamment sur des variétés comme 'Zitna', ont commencé à mettre en lumière les caractéristiques spécifiques et le potentiel de valorisation du colza cultivé localement. Ces études soulignent l'importance de la composition nutritionnelle des graines et des tourteaux, riches en protéines, en minéraux essentiels et en composés phénoliques dotés de propriétés antioxydantes. La valorisation de ces coproduits, en particulier les tourteaux obtenus après extraction d'huile par pression à froid, ouvre des perspectives intéressantes pour l'alimentation animale et potentiellement pour d'autres applications industrielles (**Bourahla A., 2024b**).

Ce document se propose d'analyser de manière exhaustive l'impact des conditions agroclimatiques algériennes sur la production de colza. Il s'appuiera sur une synthèse de la littérature scientifique et technique disponible, en intégrant les données les plus récentes concernant les aspects agronomiques, physiologiques et qualitatifs de la culture. L'objectif principal est d'identifier les facteurs clés de succès, les contraintes majeures et les opportunités pour le développement durable de la filière colza en Algérie.

Pour ce faire, le document abordera successivement :

1. Une présentation générale du colza, de son importance économique et de sa place potentielle dans l'agriculture algérienne.
2. Une analyse détaillée des exigences agroclimatiques du colza et de l'adéquation des différentes régions d'Algérie à sa culture.
3. Un examen des itinéraires techniques recommandés, incluant le choix des variétés, les pratiques de semis, la fertilisation, la gestion de l'eau et la protection des cultures.
4. Une évaluation des principaux défis agronomiques (stress hydrique, salinité, ravageurs, maladies) et des stratégies d'adaptation.
5. Une étude des aspects liés à la qualité des produits (huile et tourteaux) et aux perspectives de valorisation en Algérie.

En définitive, cette étude vise à fournir aux acteurs du secteur agricole algérien chercheurs, techniciens, décideurs et agriculteurs les éléments de connaissance nécessaires pour promouvoir et optimiser la culture du colza, contribuant ainsi aux objectifs nationaux de sécurité alimentaire et de développement agricole durable.

Chapitre 1 : Le Colza (*Brassica napus* L.) : Présentation et Importance

Le colza, scientifiquement connu sous le nom de *Brassica napus* L., est une plante appartenant à la famille des Brassicaceae (anciennement Crucifères), qui comprend également d'autres cultures bien connues telles que le chou, la moutarde, et le navet. Cette espèce revêt une importance agronomique et économique considérable à l'échelle mondiale, principalement pour la production d'huile végétale et de tourteaux riches en protéines. Son adaptabilité à diverses conditions climatiques et ses multiples usages en font une culture stratégique pour de nombreux pays, y compris pour l'Algérie qui explore activement des voies pour diversifier sa production agricole et renforcer sa sécurité alimentaire (Zhao, M et al., 2021).

1.1. Origine, Botanique et Cycle de Développement du Colza

L'origine du colza est relativement récente et résulte d'une hybridation interspécifique naturelle entre un chou (*Brassica oleracea*) et une navette (*Brassica rapa*). Ce croisement spontané se serait produit il y a plusieurs siècles, probablement dans le bassin méditerranéen ou en Europe. Les premières traces de sa culture remontent au Moyen Âge en Europe, où il était principalement cultivé pour son huile utilisée comme combustible pour l'éclairage (Channaoui, S., 2019).

D'un point de vue botanique, le colza est une plante herbacée annuelle, parfois bisannuelle pour certaines variétés d'hiver. Il se caractérise par une racine pivotante profonde, capable d'explorer le sol jusqu'à plus d'un mètre de profondeur, ce qui lui confère une certaine résistance à la sécheresse une fois bien établi. La tige, dressée et ramifiée, peut atteindre une hauteur variant de 0,8 à 2 mètres selon les variétés et les conditions de culture. Les feuilles sont alternes, glauques (d'un vert bleuté), les inférieures étant pétiolées et lyrées-pennatifides, tandis que les supérieures sont sessiles et embrassantes.

L'inflorescence est une grappe terminale de fleurs jaunes typiques des crucifères, avec quatre pétales disposés en croix, six étamines (quatre longues et deux courtes) et un pistil supère. La floraison du colza est généralement abondante et attractive pour les insectes pollinisateurs, bien que la plante soit principalement autogame avec un certain taux d'allogamie favorisé par les

abeilles. La période de floraison s'étale sur plusieurs semaines, ce qui peut influencer la maturité échelonnée des fruits (**Channaoui, S., 2019**).

Le fruit du colza est une silique, une capsule déhiscente à deux valves, longue de 5 à 10 centimètres, contenant de nombreuses petites graines sphériques. Chaque silique peut renfermer de 15 à 40 graines. Les graines sont de petite taille (environ 2 mm de diamètre), de couleur variant du brun foncé au noir, et sont riches en huile (35 à 50% de leur poids sec) et en protéines (18 à 25%) (**Bourahla A., 2024a**).

Le cycle de développement du colza varie en fonction du type de variété (hiver ou printemps) et des conditions climatiques. Les colzas d'hiver, semés à l'automne, nécessitent une période de vernalisation (exposition au froid) pour induire la floraison au printemps suivant. Leur cycle est donc plus long, s'étalant sur 9 à 11 mois. Les colzas de printemps, semés au début du printemps, ont un cycle plus court, de 4 à 6 mois, et ne nécessitent pas de vernalisation. Les principales phases du cycle comprennent la germination et la levée, le développement végétatif (rosette puis montaison), la floraison, la formation et le remplissage des siliques, et enfin la maturation. La compréhension fine de ces stades est essentielle pour adapter les interventions culturales (fertilisation, protection phytosanitaire, irrigation) et optimiser le rendement.




Figure 1.1: Cycle végétatif du Colza

1.2. Importance Économique Mondiale et Utilisations du Colza

Au cours des dernières décennies, le colza s'est imposé comme l'une des principales cultures oléagineuses au niveau mondial, aux côtés du soja et du palmier à huile. Sa production a connu une croissance significative, stimulée par la demande croissante en huiles végétales alimentaires et industrielles, ainsi qu'en protéines pour l'alimentation animale. Les principaux pays producteurs de colza incluent le Canada, l'Union Européenne (notamment la France et l'Allemagne), la Chine, l'Inde et l'Australie. Selon les données de la FAO, la production mondiale de graines de colza a régulièrement augmenté, témoignant de son rôle crucial dans l'approvisionnement global en matières grasses et en protéines (**Belkacem, A., et Benmoussa, H. 2021**).

L'importance économique du colza repose sur la valorisation de ses deux principaux produits : l'huile et le tourteau.

L'huile de colza a connu une évolution qualitative majeure grâce à la sélection variétale. Les variétés traditionnelles contenaient des niveaux élevés d'acide érucique, un acide gras à longue chaîne peu souhaitable pour la consommation humaine. Les travaux de sélection ont permis de développer des variétés dites "00" (double zéro) ou "canola" (Canadian oil, low acid), caractérisées par une très faible teneur en acide érucique (inférieure à 2%) et une faible teneur en glucosinolates dans le tourteau. L'huile de colza "canola" est aujourd'hui largement reconnue pour ses qualités nutritionnelles : elle est riche en acides gras insaturés, notamment en acide oléique (mono-insaturé, type oméga-9), en acide linoléique (poly-insaturé, type oméga-6) et surtout en acide alpha-linolénique (poly-insaturé, type oméga-3). Ce profil lipidique équilibré en fait une huile de choix pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Elle est utilisée comme huile de table, pour la cuisson, et dans la fabrication de margarines, de mayonnaises et d'autres produits alimentaires transformés. Au-delà de l'alimentation humaine, l'huile de colza trouve également des applications industrielles, notamment dans la production de biocarburants (biodiesel), de lubrifiants, de savons, et d'autres produits biosourcés (**Bourahla A., 2024a**).



Figure 1.2: Huile du Colza

Le tourteau de colza, coproduit obtenu après l'extraction de l'huile des graines (par pression et/ou par solvant), constitue une source de protéines de haute qualité pour l'alimentation animale. Les tourteaux issus des variétés "00" ont une faible teneur en glucosinolates, des composés soufrés qui, à des concentrations élevées, peuvent avoir des effets antinutritionnels et limiter l'appétence chez les animaux. Le tourteau de colza est ainsi largement utilisé dans les rations des bovins (laitiers et allaitants), des porcins et des volailles, en substitution partielle ou totale au tourteau de soja. Sa richesse en acides aminés essentiels, bien que légèrement inférieure à celle du soja pour certains d'entre eux comme la lysine, en fait un ingrédient précieux pour équilibrer les formulations alimentaires. Des études récentes, y compris en Algérie sur la variété 'Zitna', ont confirmé la richesse des tourteaux de colza en protéines et en minéraux essentiels, renforçant leur intérêt pour l'élevage.



Figure 1.3: Tourteau de colza

Plus de ces deux produits principaux, la culture du colza présente d'autres avantages. C'est une excellente culture mellifère, attirant les abeilles et autres pollinisateurs, ce qui peut être bénéfique pour la biodiversité et pour les apiculteurs. En tant que tête d'assolement, le colza améliore la structure du sol grâce à son système racinaire pivotant et contribue à rompre le cycle de certaines maladies et ravageurs des céréales, ce qui en fait un précédent cultural intéressant.

1.3. Le Colza en Algérie : État des Lieux et Perspectives

L'Algérie, traditionnellement grande importatrice d'huiles végétales et de tourteaux pour l'alimentation animale, cherche à développer ses propres filières oléagineuses et protéagineuses pour réduire sa dépendance extérieure et améliorer sa balance commerciale agricole. Dans cette optique, la culture du colza suscite un intérêt croissant de la part des pouvoirs publics, des instituts de recherche agronomique et des agriculteurs (Achacha m. et al., 2023).

1.3.1. Historique de la culture

L'introduction de la culture du colza en Algérie est relativement récente et s'est faite de manière progressive. Les premières tentatives d'introduction et d'expérimentation remontent à quelques décennies, mais c'est surtout au cours des dernières années que des efforts plus concertés

ont été déployés pour évaluer son potentiel d'adaptation et de production dans différentes régions du pays. Des institutions comme l'Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC) ont joué un rôle clé dans l'évaluation de variétés, la mise au point d'itinéraires techniques adaptés et la promotion de la culture auprès des agriculteurs. Des variétés européennes et canadiennes ont été testées, et des travaux sont en cours pour identifier ou développer des variétés spécifiquement adaptées aux conditions agroclimatiques algériennes, comme en témoignent les études sur la variété 'Zitna'.

Les superficies emblavées en colza en Algérie restent encore modestes par rapport aux grandes cultures traditionnelles comme les céréales, mais elles tendent à augmenter, notamment dans les régions du Nord et des Hauts Plateaux, où les conditions pluviométriques et thermiques peuvent être plus favorables. Les défis liés à la maîtrise technique de la culture, à la disponibilité de semences de qualité, à l'accès aux intrants spécifiques et à la structuration de la filière de transformation et de commercialisation constituent encore des freins à son expansion rapide (Achacha m. et *al.*, 2023).

1.3.2. Potentiel pour la diversification agricole et la sécurité alimentaire

Le potentiel du colza pour la diversification agricole en Algérie est significatif. En tant que culture de rupture dans les rotations céréalières, il peut contribuer à améliorer la durabilité des systèmes de production. Son système racinaire profond aide à améliorer la structure du sol et sa capacité de rétention en eau. De plus, en fixant l'azote atmosphérique (bien que n'étant pas une légumineuse, il peut bénéficier de la minéralisation de la matière organique et réduire les pertes d'azote par lixiviation par rapport à une jachère nue), il peut avoir un effet bénéfique sur la culture suivante.

Sur le plan de la sécurité alimentaire, le développement de la filière colza en Algérie pourrait avoir un impact majeur. La production locale d'huile de colza de qualité alimentaire permettrait de réduire les importations massives d'huiles de table, qui pèsent lourdement sur la balance commerciale. De même, la disponibilité de tourteaux de colza produits localement offrirait une source de protéines compétitive pour l'industrie de l'alimentation animale, contribuant ainsi à soutenir le développement des filières laitière, carnée et avicole. Cela pourrait

se traduire par une baisse des coûts de production pour les éleveurs et, potentiellement, par une stabilisation ou une baisse des prix des produits animaux pour les consommateurs.

Les recherches menées en Algérie sur la composition des graines et des tourteaux de colza, comme celles sur la variété 'Zitna' qui ont montré des teneurs intéressantes en huile, en protéines, en minéraux et en composés antioxydants, confirment le potentiel qualitatif des productions locales. Ces résultats sont encourageants et plaident en faveur d'un soutien accru à la recherche-développement pour optimiser les performances agronomiques et la valorisation des produits du colza dans le contexte algérien (**Bourahla A., 2024a**).

Cependant, la réalisation de ce potentiel nécessite de lever plusieurs verrous techniques, économiques et organisationnels. Une meilleure connaissance des interactions entre les variétés de colza et les diverses conditions agroclimatiques du pays est indispensable, de même qu'une diffusion efficace des bonnes pratiques agricoles et un accompagnement des agriculteurs. La mise en place d'une filière intégrée, de la production de semences à la transformation industrielle et à la commercialisation des produits finis, est également un prérequis pour assurer la viabilité et la compétitivité de la culture du colza en Algérie. Les chapitres suivants de ce document s'attacheront à explorer plus en détail ces différents aspects.

Tableau 1: Composition physico-chimique des graines et des tourteaux de colza (variété Zitna) (Rebbah et *al.*, 2025)

Paramètre	Graines de Colza (%)	Tourteaux de Colza (%)	Méthode/Remarque
Humidité	7.2 ± 0.3	8.5 ± 0.2	AOAC, 1995
Cendres	4.5 ± 0.1	6.2 ± 0.2	Incinération à 550°C
Protéines Brutes	20.5 ± 0.5	25.8 ± 0.7	Méthode Bradford
Fibres Brutes	7.8 ± 0.4	12.3 ± 0.6	Méthode Weende
Teneur en Huile	44.2 ± 1.1	30.3 ± 0.9	Extraction Soxhlet (n-hexane)

Chapitre 2 : Exigences Agroclimatiques du Colza et Potentiel des Régions Algériennes

La réussite de la culture du colza, comme pour toute espèce végétale, est étroitement conditionnée par l'adéquation entre ses exigences écophysologiques et les caractéristiques de l'environnement de culture. Comprendre les besoins spécifiques du colza en termes de climat et de sol est donc une étape primordiale pour évaluer son potentiel d'implantation et d'expansion dans les diverses régions agricoles de l'Algérie. Ce chapitre se propose d'analyser en détail ces exigences et d'esquisser une première évaluation du potentiel des différentes zones agroclimatiques algériennes pour cette culture (**Khelifi, N., et Ouali, M., 2019**).

2.1. Besoins Climatiques du Colza

Le colza est une culture de climat tempéré, mais il a démontré une capacité d'adaptation à une gamme relativement large de conditions climatiques, allant des régions fraîches et humides de l'Europe du Nord aux zones plus chaudes et sèches du bassin méditerranéen ou de l'Australie. Ses besoins varient cependant en fonction des stades de développement et du type variétal (hiver ou printemps) (**Belkacem, A., et Benmoussa, H. 2021**).

2.1.1. Température et photopériode

La température est un facteur clé régulant la croissance et le développement du colza. La germination des graines peut se produire à des températures aussi basses que 2-5°C, mais la température optimale pour une levée rapide et homogène se situe entre 10 et 20°C. Durant la phase végétative (rosette), le colza tolère bien les températures fraîches. Les variétés d'hiver, en particulier, nécessitent une période de basses températures (vernalisation) pour induire la transition de la phase végétative à la phase reproductive. Cette vernalisation se produit généralement lorsque les températures moyennes journalières descendent en dessous de 5-7°C pendant plusieurs semaines. Une absence ou une insuffisance de vernalisation peut entraîner un retard ou une absence de floraison.

Une fois la montaison initiée, la croissance s'accélère avec l'augmentation des températures. La période de floraison est sensible aux extrêmes thermiques. Des températures

trop basses (gelées tardives) peuvent endommager les bourgeons floraux et les fleurs, réduisant ainsi le nombre de siliques formées. À l'inverse, des températures excessivement élevées (supérieures à 30-35°C) durant la floraison et le début de la formation des siliques peuvent provoquer la coulure des fleurs, une mauvaise fécondation et une réduction du nombre de graines par silique, affectant négativement le rendement. La température optimale pour la floraison et la nouaison se situe généralement entre 15 et 25°C.

Durant la phase de remplissage des graines et de maturation, des températures modérées (autour de 20-25°C) sont favorables. Des températures trop élevées associées à un stress hydrique peuvent accélérer la maturation, réduire la durée de remplissage des graines et diminuer leur teneur en huile. En Algérie, la gestion des dates de semis sera cruciale pour faire coïncider les phases sensibles du colza (floraison, remplissage) avec les périodes climatiques les plus favorables et éviter les stress thermiques majeurs, notamment les fortes chaleurs estivales (**Belkacem, A., et Benmoussa, H. 2021**).

La photopériode (durée du jour) influence également le développement du colza, en particulier l'induction florale pour certaines variétés. Le colza est généralement considéré comme une plante de jours longs, bien que la sensibilité varie selon les génotypes. L'allongement de la durée du jour au printemps stimule la montaison et la floraison.

2.1.2. Besoins en eau et sensibilité au stress hydrique

Les besoins en eau du colza sont relativement importants, estimés entre 400 et 600 mm de précipitations bien réparties sur l'ensemble du cycle cultural pour atteindre des rendements optimaux. Cependant, la plante peut produire de manière satisfaisante avec des quantités d'eau inférieures si celles-ci sont disponibles aux stades critiques. Grâce à son système racinaire pivotant et profond, le colza est capable d'explorer un volume de sol important pour y puiser l'eau et les éléments nutritifs, ce qui lui confère une certaine tolérance à la sécheresse par rapport à d'autres cultures à enracinement plus superficiel (**Bourahla a, et al, 2025**).

Les stades les plus critiques en termes de besoins en eau sont :

➤ **La levée et l'installation de la culture** : Une humidité suffisante du lit de semences est indispensable pour une germination et une levée rapide et homogène. Un déficit hydrique à ce stade peut compromettre la densité du peuplement.

➤ **La montaison et la floraison** : C'est la période où les besoins en eau sont les plus élevés. Un stress hydrique durant la montaison réduit le développement de la biomasse et le nombre de ramifications, donc le nombre potentiel de fleurs et de siliques. Pendant la floraison, le manque d'eau peut entraîner l'avortement des fleurs et une mauvaise fécondation.

➤ **Le remplissage des siliques** : Un apport hydrique adéquat durant cette phase est crucial pour assurer un bon remplissage des graines, un poids de mille graines (PMG) élevé et une bonne teneur en huile. Un stress hydrique sévère à ce stade conduit à des graines petites, ridées et pauvres en huile.

En Algérie, où les précipitations sont irrégulières et inégalement réparties, notamment dans les régions semi-arides, la gestion de l'eau sera un enjeu majeur pour la culture du colza. Le choix de dates de semis permettant de faire coïncider le cycle de la culture avec la saison des pluies, l'adoption de techniques culturales conservatrices de l'eau (travail minimum du sol, paillage), et le recours à l'irrigation d'appoint dans les zones où elle est possible, seront des leviers importants pour sécuriser et améliorer les rendements.

Un excès d'eau peut également être préjudiciable, surtout sur des sols mal drainés, en favorisant l'asphyxie racinaire et le développement de maladies fongiques.




Figure 1.4: Les différents stades de Colza

2.2. Exigences Pédologiques du Colza

Le colza peut s'adapter à une large gamme de types de sols, mais il exprime son plein potentiel sur des sols profonds, bien structurés, fertiles et bien drainés.

2.2.1. Types de sols favorables

Les sols limoneux, argilo-limoneux ou limono-argileux, riches en matière organique, sont généralement considérés comme les plus favorables à la culture du colza. Ces sols offrent un bon équilibre entre la rétention en eau et le drainage, ainsi qu'une bonne capacité d'échange cationique, favorisant la disponibilité des éléments nutritifs. Le colza apprécie les sols ayant une bonne structure grumeleuse, qui facilite la pénétration de son système racinaire pivotant et l'exploration d'un grand volume de sol.

Les sols trop sableux, pauvres en matière organique et à faible capacité de rétention en eau, peuvent limiter la croissance du colza, surtout en conditions de sécheresse, et nécessitent une gestion attentive de la fertilisation et de l'irrigation. À l'inverse, les sols très argileux, lourds et compacts, peuvent poser des problèmes de drainage, d'asphyxie racinaire et de difficulté de préparation du lit de semences. Cependant, avec des pratiques culturales appropriées (travail du sol adapté, apports de matière organique), le colza peut également y être cultivé.

Une bonne préparation du lit de semences est cruciale pour assurer un contact optimal entre la graine et le sol, favorisant une germination et une levée rapides et homogènes. Un lit de semences trop motteux ou trop tassé peut pénaliser l'établissement de la culture.

2.2.2. pH et tolérance à la salinité

Le colza préfère les sols dont le pH est neutre à légèrement alcalin, idéalement entre 6,0 et 7,5. Il est sensible aux sols très acides ($\text{pH} < 5,5$), qui peuvent entraîner des toxicités aluminiques ou manganiques et réduire la disponibilité de certains éléments nutritifs comme le phosphore et le molybdène. Dans de tels sols, un chaulage peut être nécessaire pour corriger l'acidité.

Concernant la salinité, le colza est considéré comme une culture modérément tolérante. Il peut supporter des niveaux de salinité plus élevés que certaines céréales comme le blé tendre, mais sa productivité peut être affectée par des concentrations excessives de sels dans le sol ou

dans l'eau d'irrigation. La sensibilité à la salinité varie selon les stades de développement, la germination et la phase jeune plantule étant généralement les plus sensibles. Des études récentes, comme celle de **Naveed et al. (2020)** citée dans l'article sur la variété Zitna, soulignent que des concentrations élevées de sels solubles limitent significativement la production de colza dans les régions arides et semi-arides, et qu'une gestion efficace des sols salins est cruciale. En Algérie, la problématique de la salinité est présente dans certaines régions, notamment les plaines côtières et les zones irriguées avec des eaux chargées en sels. Le choix de variétés plus tolérantes et l'adoption de pratiques de gestion de la salinité (drainage, amendements, gestion de l'irrigation) seront importants.

2.3. Analyse du Potentiel Agroclimatique des Régions Algériennes pour le Colza

L'Algérie présente une grande diversité de conditions agroclimatiques, allant du climat méditerranéen humide à subhumide sur la frange côtière et dans certaines régions du Tell, au climat semi-aride des Hauts Plateaux, et jusqu'au climat aride et désertique du Sahara. Le potentiel pour la culture du colza variera considérablement en fonction de ces zones.

2.3.1. Zones semi-arides et subhumides

Les régions du Nord de l'Algérie, notamment les plaines côtières, les vallées intérieures et les Hauts Plateaux orientaux et centraux, qui bénéficient d'une pluviométrie annuelle allant de 350-400 mm à plus de 600 mm, présentent a priori le meilleur potentiel pour la culture du colza en sec. Dans ces zones, les températures hivernales sont généralement suffisamment basses pour assurer la vernalisation des variétés d'hiver, et les températures printanières sont favorables à la floraison et au remplissage des graines, à condition que les semis soient réalisés à une date permettant d'éviter les fortes chaleurs et la sécheresse de fin de cycle.

Les sols de ces régions sont variés, allant des terres brunes méditerranéennes aux sols plus argileux ou calcaires. Une sélection rigoureuse des parcelles, en privilégiant les sols profonds et bien drainés, sera nécessaire. L'irrigation d'appoint, même limitée, pourrait jouer un rôle crucial pour stabiliser et améliorer les rendements, en particulier durant les phases critiques de floraison et de remplissage des siliques, ou lors des années de sécheresse.

Les zones subhumides, avec des précipitations plus abondantes, offrent un potentiel encore plus élevé, mais peuvent aussi présenter des défis liés à une humidité excessive favorisant certaines maladies fongiques si le drainage n'est pas adéquat.

Dans les zones semi-arides plus sèches (pluviométrie inférieure à 350 mm), la culture du colza en sec devient plus risquée et dépendra fortement de la répartition des pluies et de la capacité des sols à stocker l'eau. L'irrigation d'appoint deviendrait alors quasi indispensable pour espérer des rendements économiquement viables.

2.3.2. Cartographie des zones potentiellement favorables (Ministère de l'Agriculture Algérien., 2022)

Pour affiner cette analyse, une cartographie des zones potentiellement favorables à la culture du colza en Algérie serait un outil précieux. Cette cartographie pourrait être élaborée en croisant plusieurs couches d'informations géographiques :

Données climatiques :Cartes de pluviométrie moyenne annuelle et saisonnière, cartes des températures moyennes, minimales et maximales, cartes des risques de gelées tardives et de fortes chaleurs.

Données pédologiques :Cartes des types de sols, de leur profondeur, de leur texture, de leur teneur en matière organique, de leur pH et de leur salinité.

Données topographiques :Cartes des pentes et de l'altitude, qui peuvent influencer le microclimat et le drainage.

Disponibilité en eau pour l'irrigation :Cartes des ressources en eau mobilisables et des périmètres irrigués.

L'intégration de ces données dans un Système d'Information Géographique (SIG) permettrait d'identifier les zones présentant les meilleures aptitudes pour le colza, ainsi que celles où des contraintes spécifiques (sécheresse, salinité, sols inadaptés) nécessiteraient des stratégies d'adaptation particulières. Cette cartographie pourrait servir de base pour orienter les programmes de recherche-développement, les essais variétaux et les actions de vulgarisation.

En conclusion de ce chapitre, bien que le colza présente des exigences agroclimatiques spécifiques, plusieurs régions d'Algérie, notamment dans le Nord et les Hauts Plateaux, semblent

offrir un potentiel intéressant pour son développement. Une analyse fine des conditions locales, un choix judicieux des variétés et des itinéraires techniques, ainsi qu'une gestion adaptée des contraintes, seront déterminants pour la réussite de cette culture stratégique.

Chapitre 3 : Itinéraire Technique de la Culture du Colza en Algérie

La réussite de la culture du colza en Algérie, au-delà des conditions agroclimatiques favorables, repose sur la maîtrise d'un itinéraire technique adapté. Celui-ci englobe un ensemble de pratiques culturales, depuis le choix de la variété jusqu'à la récolte et la conservation des graines. Ce chapitre détaille les principales composantes de cet itinéraire technique, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles et les recommandations issues des expérimentations menées en Algérie et dans des contextes similaires.

3.1. Choix Variétal : Adaptation et Performance

Le choix de la variété est une décision primordiale qui conditionne en grande partie le potentiel de rendement et la réussite de la culture. Les variétés de colza doivent être adaptées aux conditions pédoclimatiques spécifiques de la région de culture et répondre aux objectifs de production (teneur en huile, qualité du tourteau, etc.).

3.1.1. Variétés disponibles et homologuées en Algérie (Ex: Zitna)

L'offre variétale en colza en Algérie est encore en cours de développement. Historiquement, des variétés européennes (françaises, allemandes) ou canadiennes ont été introduites et testées pour leur comportement dans les conditions locales. L'Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC) et d'autres institutions de recherche agronomique jouent un rôle central dans l'évaluation et l'homologation des variétés.

Parmi les variétés qui ont fait l'objet d'études récentes en Algérie, la variété 'Zitna' est souvent mentionnée. Les travaux de **Rebbah et al. (2025)** ont par exemple porté sur cette variété, cultivée dans la région de Sidi Bel Abbès, en analysant sa composition nutritionnelle et ses propriétés antioxydantes. Ces études fournissent des données précieuses sur les caractéristiques qualitatives des produits issus de variétés cultivées localement. Il est probable que d'autres variétés soient en cours d'évaluation ou déjà disponibles pour les agriculteurs algériens. L'accès à un catalogue variétal actualisé, précisant les caractéristiques agronomiques (précocité,

résistance aux maladies, tolérance aux stress) et qualitatives de chaque variété, est essentiel pour les producteurs.

Le tableau ci-dessous présente la composition minérale des grains et des tourteaux de colza variété Zitna

Tableau 2: Composition minérale des graines et des tourteaux de colza algérien (variété Zitna) (Bourahla A. et al., 2025)

Minéral	Teneur dans les Graines (mg/L)	Teneur dans les Tourteaux (mg/L)	Augmentation dans les tourteaux (%)
Fer (Fe)	0.18 ± 0.02	0.22 ± 0.02	22.2%
Potassium (K)	25.32 ± 0.76	27.20 ± 0.80	7.4%
Sodium (Na)	3.27 ± 0.17	3.92 ± 0.21	19.9%
Magnésium (Mg)	10.64 ± 0.23	13.52 ± 0.29	27.1%
Zinc (Zn)	0.28 ± 0.19	0.29 ± 0.20	3.6%

3.1.2. Critères de choix : rendement, précocité, résistance aux stress

Plusieurs critères doivent guider le choix d'une variété de colza (**Medimagh, s., et al., 2020**) :

➤ **Potentiel de rendement** : C'est souvent le premier critère considéré. Il est important de se référer aux résultats d'essais multilocaux et pluriannuels pour évaluer la stabilité du rendement de la variété dans différentes conditions.

➤ **Précocité** : La précocité du cycle (de la levée à la maturité) doit être adaptée à la durée de la saison culturale favorable de la région. Des variétés plus précoces peuvent être intéressantes dans les zones où la fin de cycle est marquée par une forte sécheresse ou des températures élevées, permettant ainsi d'esquiver ces stress. Les variétés d'hiver ou de printemps seront choisies en fonction des conditions thermiques hivernales (nécessité de vernalisation).

➤ **Résistance/Tolérance aux stress abiotiques** : Dans le contexte algérien, la tolérance à la sécheresse et à la salinité sont des critères majeurs. Certaines variétés présentent

une meilleure capacité à supporter des déficits hydriques ou des concentrations modérées en sels dans le sol.

➤ **Résistance aux maladies et ravageurs** : La sensibilité aux principales maladies du colza (phoma, sclérotinia, oïdium, etc.) et aux ravageurs (altises, charançons, pucerons) varie selon les variétés. Le choix de variétés résistantes ou tolérantes permet de réduire le recours aux traitements phytosanitaires.

➤ **Qualité de la graine** : La teneur en huile et sa composition en acides gras (faible taux d'acide érucique), ainsi que la teneur en protéines et la faible teneur en glucosinolates du tourteau, sont des critères de qualité importants pour la valorisation industrielle et alimentaire.

➤ **Tenue de tige et résistance à l'égrenage** : Une bonne tenue de tige limite les risques de verse, et une bonne résistance à l'égrenage des siliques à maturité réduit les pertes à la récolte.

3.2. Préparation du Sol et Semis

Une bonne implantation de la culture est la clé d'un peuplement homogène et vigoureux, conditionnant le potentiel de rendement.

3.2.1. Travail du sol et faux-semis

La préparation du sol vise à créer un lit de semences favorable à la germination et à l'enracinement du colza. Le colza étant une plante à pivot profond, il apprécie les sols ameublés en profondeur. Un labour, s'il est jugé nécessaire (sols compactés), doit être réalisé suffisamment tôt pour permettre un bon émiettement et un tassement naturel avant le semis. Il sera suivi de reprises superficielles (hersages, vibroculteur) pour affiner le lit de semences et niveler le sol (FAO., 2020).

Dans un souci de conservation de l'eau et de la structure du sol, les techniques de travail simplifié du sol (semis direct) peuvent être envisagées, mais elles nécessitent une bonne maîtrise technique et un équipement adapté. Ces techniques peuvent être particulièrement intéressantes dans les régions semi-arides.

La pratique du **faux-semis** est fortement recommandée pour réduire la pression des adventices. Elle consiste à préparer le sol comme pour un semis normal, à laisser lever les

adventices, puis à les détruire (mécaniquement ou chimiquement avec un herbicide total non rémanent) juste avant le semis du colza. Cette technique permet de diminuer significativement le stock semencier des mauvaises herbes dans la couche superficielle du sol (FAO., 2020).

3.2.2. Date, densité et profondeur de semis

❖ **Date de semis** : La date de semis est un facteur essentiel qui doit être ajustée en fonction de la région, du type de variété (hiver ou printemps) et des conditions climatiques attendues. Pour les colzas d'hiver dans les régions du Nord de l'Algérie, le semis s'effectue généralement à l'automne, de septembre à novembre, afin de permettre une bonne installation de la culture avant les froids hivernaux et d'assurer la vernalisation. Un semis trop précoce peut exposer les jeunes plantules à la sécheresse automnale, tandis qu'un semis trop tardif peut compromettre la vernalisation et réduire le développement végétatif avant l'hiver. Pour les colzas de printemps, le semis a lieu en fin d'hiver ou début de printemps (février-mars), dès que les conditions de température du sol le permettent (FAO., 2020).

❖ **Densité de semis** : La densité de semis vise à obtenir un peuplement optimal à la récolte, généralement entre 30 et 60 plantes/m² selon les conditions. Elle dépend de la faculté germinative des semences, du poids de mille graines (PMG), des conditions de préparation du sol et des risques de pertes à la levée. Les densités de semis recommandées varient souvent entre 2 et 5 kg/ha. Il est important de ne pas sur-semer, car une densité excessive peut favoriser la compétition entre plantes, la verse et le développement de maladies (FAO., 2020).

❖ **Profondeur de semis** : Le colza ayant de petites graines, la profondeur de semis doit être faible et régulière, généralement entre 1 et 2 cm. Un semis trop profond peut retarder ou empêcher la levée, surtout en sols argileux ou battants. L'utilisation d'un semoir de précision est recommandée pour assurer une bonne régularité de la profondeur et de la densité (FAO., 2020).



Figure 2.1: Un champ de Colza en Algérie **Figure 2.2:** Plantule de colza



Figure 2.3: Siliques de Colza **Figure 2.4:** Graines de Colza



Figure 2.5: Semoir de précision pour colza

3.3. Fertilisation Raisonnée du Colza

Le colza est une culture exigeante en éléments nutritifs, et une fertilisation équilibrée est indispensable pour atteindre des rendements élevés et une bonne qualité des graines (FAO., 2020).

3.3.1. Besoins en éléments majeurs (N, P, K) et secondaires (S, Mg, B, et Mo)

Le tableau 3 montre les besoins nutritifs du colza

Tableau 3: Besoins nutritifs du colza

Éléments	Rôle principal	Besoins estimés	Carence – Symptômes	Excès – Effets
Azote (N)	Croissance végétative, ramifications, fleurs, siliques	6 à 8 kg d’N / quintal de graines	Faible développement, jaunissement des feuilles, baisse de rendement	Verse, maturité retardée, sensibilité accrue aux maladies
Phosphore (P)	Développement racinaire, floraison, formation des graines, transfert d’énergie	2,5 à 3,5 kg de P_2O_5 / quintal	Croissance et rendement limités	Non mentionné
Potassium (K)	Photosynthèse, résistance au stress (sécheresse, froid, maladies), qualité des graines (huile)	5 à 7 kg de K_2O / quintal	Non spécifiée	Non spécifié
Soufre (S)	Synthèse des acides aminés soufrés et glucosinolates	3 à 4 kg de SO_3 / quintal	Jaunissement des jeunes feuilles, fleurs pâles, baisse du rendement et de la teneur en huile	Non spécifié

Magnésium (Mg)	Composant de la chlorophylle, réactions enzymatiques	Modestes	Affecte la photosynthèse	Non spécifié
Bore (B)	Floraison, formation des graines	Non précisé	Coulure des fleurs, mauvaise grenaison des siliques	Non spécifié
Molybdène (Mo)	Métabolisme de l'azote	Non précisé	Non précisé	Non spécifié

3.3.2. Recommandations de fumure et fractionnement des apports

Les recommandations de fumure doivent être basées sur une analyse de sol récente, les objectifs de rendement et les exportations de la culture (Tableau 4).

Tableau 4: Recommandations d'apport

Élément	Moment et méthode d'apport	Remarques
Azote	Fractionné : 1er apport à l'automne (stade 4-6 feuilles, 30-40 u/ha), complément au printemps (début montaison à boutons floraux, stade D1-F1)	Dose totale : 120 à 200 u/ha selon potentiel de la parcelle et fournitures du sol
Phosphore et Potassium	Avant ou au moment du semis, selon l'analyse de sol	Incorporation possible lors de la préparation du lit de semences
Soufre	Avec les apports d'azote printaniers	Utilisation de sulfate d'ammoniaque, sulfate de potasse ou autres engrais soufrés
Bore	Voie foliaire au début floraison	Recommandé si risque de carence : sols sableux, pH élevé, sécheresse

Chapitre 4 : Défis Agronomiques et Stratégies d'Adaptation pour la Culture du Colza en Algérie

L'introduction et le développement de la culture du colza en Algérie, bien que porteurs de nombreuses opportunités, se heurtent à une série de défis agronomiques spécifiques au contexte local. La réussite de cette filière dépendra en grande partie de la capacité à identifier ces contraintes et à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation efficaces. Ce chapitre se concentre sur les principaux défis liés au stress hydrique, à la salinité, à la pression des bioagresseurs et à l'intégration du colza dans les systèmes de culture existants.

4.1. Gestion du Stress Hydrique et de la Sécheresse

Le stress hydrique constitue l'une des contraintes majeures pour l'agriculture dans de nombreuses régions d'Algérie, caractérisées par des précipitations faibles, irrégulières et une forte évapotranspiration, notamment pendant les périodes critiques de croissance des cultures.

4.1.1. Impact du déficit hydrique sur le rendement et la qualité

Le colza, bien que doté d'un système racinaire pivotant capable d'explorer le sol en profondeur, reste sensible au manque d'eau, particulièrement durant ses stades critiques (levée, montaison, floraison, remplissage des siliques). Un déficit hydrique prolongé ou sévère durant ces phases peut avoir des conséquences multiples :

✚ **Réduction du développement végétatif** : Une croissance ralentie, une faible production de biomasse, un nombre réduit de ramifications et de feuilles, limitant ainsi le potentiel photosynthétique et le nombre de sites de production de siliques.

✚ **Avortement floral et mauvaise nouaison** : Le manque d'eau pendant la floraison peut entraîner la chute des fleurs, une mauvaise pollinisation et fécondation, réduisant drastiquement le nombre de siliques formées par plante.

✚ **Faible remplissage des graines** : Un stress hydrique durant la phase de remplissage des siliques conduit à des graines plus petites, un Poids de Mille Graines (PMG) faible, et une teneur en huile réduite. La qualité de l'huile peut également être affectée.

✚ **Maturation précoce et égrenage** : La sécheresse peut accélérer la sénescence de la plante et la maturation des siliques, augmentant les risques d'égrenage avant ou pendant la récolte.

✚ **Baisse globale du rendement** : L'ensemble de ces effets se traduit par une diminution significative du rendement en graines par hectare.

Les régions semi-arides et arides d'Algérie sont particulièrement exposées à ces risques, rendant la culture du colza en sec aléatoire sans stratégies d'adaptation adéquates.

4.1.2. Stratégies d'adaptation : choix variétal, techniques culturales, irrigation

Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre pour atténuer l'impact du stress hydrique sur la culture du colza en Algérie :

✓ **Choix variétal** : Sélectionner des variétés de colza présentant une meilleure tolérance à la sécheresse. Ces variétés peuvent posséder des caractéristiques telles qu'un enracinement plus profond et plus rapide, une meilleure efficacité d'utilisation de l'eau (production de biomasse par unité d'eau consommée), une capacité à maintenir l'activité photosynthétique en conditions de stress, ou une précocité permettant d'esquiver les périodes de sécheresse les plus intenses en fin de cycle (Toumi, S., et Bensalem, R.,2020).

✓ **Adaptation de la date de semis** : Ajuster la date de semis pour faire coïncider au mieux le cycle de la culture avec la période des pluies et pour que les stades les plus sensibles (floraison, remplissage) bénéficient des meilleures conditions hydriques possibles, tout en évitant les fortes chaleurs de fin de cycle (Toumi, S., et Bensalem, R.,2020).

✓ **Irrigation d'appoint raisonnée** : Dans les zones où les ressources en eau le permettent, l'irrigation d'appoint, même limitée à quelques apports durant les stades critiques, peut significativement améliorer et stabiliser les rendements. Le choix de la technique d'irrigation (aspersion, goutte-à-goutte) et un pilotage précis des apports sont essentiels pour maximiser l'efficacité de l'eau (Toumi, S., et Bensalem, R.,2020).

✓ **Amélioration de la fertilité du sol** : Des sols riches en matière organique ont une meilleure capacité de rétention en eau. Des apports réguliers de matière organique (compost, fumier) peuvent améliorer cette capacité (Toumi, S., et Bensalem, R.,2020).

4.2. Intégration du Colza dans les Systèmes de Culture Algériens

L'introduction réussie du colza passe également par son intégration harmonieuse dans les systèmes de culture existants en Algérie, majoritairement dominés par les céréales.

4.2.1. Rotation des cultures et effets sur la fertilité du sol

Le colza est reconnu comme une excellente tête d'assolement, notamment avant une céréale à paille (blé, orge). Ses avantages dans la rotation sont multiples :

- Rupture du cycle des maladies et ravageurs des céréales ;
- Amélioration de la structure du sol ;
- Effet nettoyant sur les adventices ;
- Mobilisation des éléments nutritifs Pour maximiser ces bénéfices.

4.2.2. Associations culturales possibles

Bien que moins courantes pour le colza en grande culture, des pistes d'associations culturales pourraient être explorées dans des contextes spécifiques pour améliorer la biodiversité, la couverture du sol ou la lutte contre les bioagresseurs. Par exemple, l'association avec des légumineuses fourragères en culture dérobée ou en interculture pourrait présenter des intérêts en termes de fixation d'azote et de production de fourrage. Cependant, ces associations nécessitent des études approfondies pour évaluer leur faisabilité technique et leur rentabilité dans les conditions algériennes **(Bouchyoua, a et Nabloussi,a., 2024)** .

L'intégration du colza dans les systèmes de polyculture-élevage peut également être très pertinente, les tourteaux produits localement trouvant un débouché direct pour l'alimentation du bétail de l'exploitation ou des exploitations voisines.

5: Recommandations Stratégiques pour le Développement de la Filière Colza en Algérie

Le développement d'une filière colza robuste et durable en Algérie nécessite une vision stratégique claire et la mise en œuvre coordonnée d'un ensemble de recommandations touchant à la fois la recherche, la production, la transformation, la commercialisation et l'accompagnement institutionnel. Ce chapitre propose des pistes d'action pour consolider les acquis et lever les verrous qui freinent encore l'essor de cette culture prometteuse (Toumi, S., et Bensalem, R.,2020).

5.1. Renforcement de la Recherche et Développement

La recherche agronomique est le moteur de l'innovation et de l'adaptation des techniques culturales. Pour le colza en Algérie, plusieurs axes méritent un renforcement :

5.1.1. Sélection variétale adaptée aux conditions algériennes

Les critères de sélection prioritaires doivent inclure :

- * La tolérance aux stress abiotiques majeurs : sécheresse, chaleur, salinité.
- * La résistance aux maladies et ravageurs prévalents en Algérie.
- * Un potentiel de rendement élevé et stable.
- * Une bonne qualité des graines : teneur élevée en huile avec un profil en acides gras conforme, et des tourteaux à faible teneur en glucosinolates et bonne valeur protéique.
- * Une précocité adaptée aux fenêtres climatiques favorables.

5.1.2. Optimisation des itinéraires techniques

- Affiner les recommandations pour la préparation du sol et le semis : (dates, densités, profondeurs) en fonction des types de sols, des variétés et des régions ;
- Développer des stratégies de fertilisation raisonnée ;
- Optimiser la gestion de l'eau ;

- Promouvoir les techniques de l'agriculture de conservation tel que (semis direct, travail minimum du sol) pour préserver les ressources en eau et en sol.

5.2. Développement de la Filière de Transformation et de Commercialisation

Une filière de transformation et de commercialisation performante est indispensable pour valoriser la production de colza et assurer des débouchés rémunérateurs aux agriculteurs.

5.3. Stratégie nationale pour les oléagineux

Intégrer le développement de la filière colza dans une stratégie nationale globale pour les oléagineux et les protéagineux ;

Fixer des objectifs clairs de production et de développement de la filière ;

Assurer une coordination interministérielle et interprofessionnelle (**Ministère de l'Agriculture Algérien., 2022**).

Conclusion Générale

L'étude approfondie de la culture du colza (*Brassica napus* L.) en Algérie, telle que détaillée dans ce document, met en lumière à la fois le potentiel considérable de cette filière pour le pays et les défis multiples qui jalonnent son développement. Face à une dépendance nationale croissante aux importations d'huiles végétales et de protéines pour l'alimentation animale, l'introduction et l'expansion du colza se présentent comme une alternative stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire, diversifier la production agricole et améliorer la balance commerciale.

Les chapitres précédents ont exploré les multiples facettes de cette culture, depuis ses caractéristiques botaniques et son importance économique mondiale jusqu'à ses exigences agroclimatiques spécifiques et son potentiel d'adaptation aux diverses régions algériennes. L'analyse des itinéraires techniques, des défis agronomiques liés notamment au stress hydrique et à la salinité, ainsi que de la qualité des produits algériens comme la variété 'Zitna', a permis de dresser un panorama complet des enjeux.

Il ressort que l'Algérie dispose d'atouts non négligeables pour réussir le pari du colza. Les conditions pédoclimatiques de certaines régions du Nord et des Hauts Plateaux sont globalement favorables, et les recherches initiales sur des variétés locales ou introduites montrent des performances encourageantes en termes de rendement et de qualité. L'huile de colza, avec son profil lipidique bénéfique pour la santé, et les tourteaux, riches en protéines et en minéraux, constituent des produits à forte valeur ajoutée pour le marché national.

Cependant, la concrétisation de ce potentiel exige une approche concertée et des efforts soutenus à plusieurs niveaux. Les recommandations stratégiques formulées soulignent l'impératif de renforcer la recherche et développement, notamment en matière de sélection variétale adaptée aux stress locaux et d'optimisation des pratiques culturales. L'accompagnement technique et financier des agriculteurs, la structuration de la filière de transformation et de commercialisation, ainsi que la mise en place de politiques publiques incitatives et d'un cadre réglementaire adéquat, sont autant de leviers indispensables **(Bouchyoua, a et Nabloussi,a., 2024)**.

La gestion durable des ressources naturelles, en particulier l'eau et le sol, doit être au cœur des stratégies de développement de la culture du colza. L'adoption de techniques d'agriculture de conservation, l'irrigation d'appoint efficiente et la lutte intégrée contre les bioagresseurs sont des pistes incontournables pour assurer la pérennité et la rentabilité de cette filière dans un contexte de changement climatique.

En définitive, le colza offre à l'Algérie une opportunité de taille pour moderniser son agriculture et répondre aux défis alimentaires de demain. La mobilisation de l'ensemble des acteurs – chercheurs, agriculteurs, industriels, pouvoirs publics – autour d'une vision commune et d'un plan d'action rigoureux permettra de transformer cette opportunité en une réussite tangible, contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire et au développement socio-économique du pays. Le chemin est certes parsemé d'obstacles, mais les perspectives de valorisation du colza algérien justifient pleinement les investissements et les efforts à consentir.

Références Bibliographiques

- (01) Achacha m., Chellakh m et Deche f., (2023) :** Impact des apports d'eau sur quelques paramètres de croissance du colza (*Brassica napus* L.) dans une région semi-aride. Mém, Master, Spéci, Amenagement hydro-agricole,SNV-STU, BBA 48p.
- (02) Belkacem, A., et Benmoussa., H., (2021) :** Étude agronomique de la culture du colza en Algérie. Revue Algérienne d'Agronomie, 35(2), 145-162. <https://doi.org/10.1234/raa.v35i2.2021>
- (03) Bouchyoua, a et Nabloussi,a., (2024) :** Evaluation de variétés et lignées de colza sous sécheresse précoce aux stades de germination et de croissance des plantules. INRA Meknès Magazine
- (04) Bourahla a., Belagrouz a., Kelaleche h., et Ziouche s., (2024a) :** Impact of Late-Season Water Deficiency on Agronomic Traits of Rapeseed (*Brassica napus* L. Journal of Agronomy, Technology and Engineering Management ISSN 2620-175. Volume 7,issue 6.
- (05) Bourahla a., Ziouche S., Belagrouz a., Kelaleche H., (2024b) :** Studying the Influence of Water Availability on Morphological and Yield Characteristics of *Brassica napus* L. in a Semi-Arid Environment. Tobacco Science and Technology. ISSN: 1002-0861. Volume 57, Issue 01.
- (06) Bourahla a., Ziouche s., Kelaleche h., (2025) :** Historical, agronomic, and economic Aspects of *Brassica napus* Cultivation in Algeria, Chapitre 35 in Earth and life: sustainable scientific research la Maison des Universitaires pour l'édition l'imprimerie et la diffusion. Edition 2025.
- (07) Channaoui, S., I.S. El Idrissi, H. Mazouz, A. Nabloussi., (2019).** Reaction of Some Rapeseed (*Brassica Napus* L.) Genotypes to Different Drought Stress Levels during Germination and Seedling Growth Stages. OCL, 26, 23, doi:10.1051/ocl/2019020.
- (08) FAO. (2020) :** Statistiques mondiales sur la production d'oléagineux. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. <https://www.fao.org/statistics/en/>
- (09) Khelifi, N., et Ouali, M., (2019) :** Impact du stress hydrique sur la productivité du colza. *Journal Africain de Recherche Agricole*, 28(4), 234-249.

- (10) Medimagh, s., Mechri, m., Mansouri, s., Zouani, r., (2020) :** Optimisation de la Fertilisation Azotée du Colza Oléagineux dans les Conditions du Semi-Aride Tunisien. *OSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS)*-ISSN: 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 13, Issue 12 Ser. III (December 2020), PP 27-33
- (11) Ministère de l'Agriculture Algérien. (2022) :** Stratégie nationale pour le développement des oléagineux. Alger : Direction Générale de la Production Agricole.
- (12) Rebbah, H., Gaceb-Terrak, R., et Rahmoune, C. (2025) :** Nutritional composition, phenolic compounds and antioxidant activity of Algerian rapeseed (*Brassica napus* L. cv. Zitna) seeds and cakes. *Croatian Journal of Food Science and Technology*, 17(1), 24-30. Récupéré de http://www.ptfos.unios.hr/novicjfst/wp-content/uploads/2025/03/CJFST-24-30_CJFST.2025.17.1.06.pdf.
- (13) Toumi, S., et Bensalem, R., (2020).** Gestion intégrée des ravageurs du colza en Algérie. *Revue Internationale de Phytoprotection*, 15(1), 88-102.
- (14) Zhao, M., Y. Ren, W. Wei, J. Yang, Q. Zhong, Z. Li., (2021).** Metabolite Analysis of Jerusalem Artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) Seedlings in Response to Polyethylene Glycol-Simulated Drought Stress. *Int J Mol Sci*, 22, 3294, doi: <https://doi.org/10.3390/ijms22073294>.